CULTURA DA SOJA: PLANTAS DANINHAS

Disciplina: Culturas de Plantas Oleaginosas

Curso: Agronomia

Responsável: Fernando Celoto

1. INTRODUÇÃO

- **PLANTAS DANINHAS**

- Considera-se planta daninha uma planta que cresce onde não é desejada (SHAW, 1982; LORENZI, 1982).

- Segundo PITELLI (1985), aquelas que, espontaneamente, emergem nos ecossistemas agrícolas podendo causar uma série de fatores às plantas cultivadas que irão interferir na **produtividade** e na **operacionalização** do sistema de produção empregado.

CONSIDERAÇÕES

- ❖ Planta daninha → importante em qualquer cultura
- ❖ Soja → sensível a mato-competição
- ❖ Fundamental → manejo correto
- ❖ Químico → predominante

2. CONCEITOS

- **INTERFERÊNCIA:** Conjunto de **pressões** ambientais que recebe uma determinada cultura agrícola em **decorrência da presença das plantas infestantes** no agroecossiste.
- **DIRETA** - competição pelos recursos do meio, a alelopatia e o parasitismo.
- **INDIRETA** - prejuízos à colheita e tratos culturais, hospedeiras intermediárias de pragas, doenças e nematoides.

INTERFERÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS EM SOJA

- **COMPETIÇÃO** - perdas de produção de até 80%
- Redução na **QUALIDADE** dos grãos
- **HOSPEDAM** pragas e doenças

INTERFERÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS EM SOJA

- **COMPETIÇÃO** - perdas de produção de até 80%
- Redução na **QUALIDADE** dos grãos
- **HOSPEDAM** pragas e doenças
- Dificultam a operação da **COLHEITA**
- Dificultam os **TRATOS CULTURAIS**

Dificuldade na colheita...

Perdas na colheita...

INTERFERÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS EM SOJA

- **COMPETIÇÃO** - perdas de produção de até 80%
- Redução na **QUALIDADE** dos grãos
- **HOSPEDAM** pragas e doenças
- Dificultam a operação da **COLHEITA**
- Dificultam os **TRATOS CULTURAIS**
- **ALELOPATIA**
- Condenam **LOTES** de sementes

PROBLEMA - COMPETIÇÃO

- Mecanismos que as tornam mais competitivas:
- Sobrevivência sob condições adversas;
- Produção de grande quantidade de sementes;
- Alta capacidade de dispersão;
- Mecanismos de propagação eficientes (rizomas e tubérculos)

A COMPETIÇÃO DEPENDE:

- ... da espécie da planta daninha,
- ... da sua distribuição na área,
- ... e do período em que permanecem concorrendo.

**Período de
convivência e manejo!**

Fatores que afetam o grau de interferência entre as culturas e as plantas daninhas (Adaptado de Bianchi, 1998)

Figura. Perdas em sc/ha em função da infestação de 25 plantas/m² de *Euphorbia heterophylla* ao longo do tempo. (Adaptado de Constantin et al., 2000)

Produtividade em kg/ha e sacos(sc)/ha de soja e intensidade de infestações (média de classes) de capim-amargoso. Gazziero&Adegas

2. CONCEITOS

- PERÍODO DE CONVIVÊNCIA

- Espaço de tempo em que convivem, em um mesmo local, as plantas cultivadas e as plantas daninhas.
- **Período Anterior à Interferência (PAI)** → período de convivência entre planta daninha e cultura da soja, sem interferência negativa
- **Período Crítico de Proteção à Interferência (PCPI)** → período em que as práticas de controle de plantas daninhas são extremamente necessárias
- **Período Total de Proteção à Interferência (PTPI)** → período entre a implantação da cultura e o momento em que as práticas de controle deixam de ser necessárias → período de ação dos herbicidas PPI e PRÉ - Emergentes

Período de convivência e controle de plantas daninhas em soja

Valores do período total de prevenção á interferência, observados por diferentes autores para grandes culturas.

Cultura	PTPI	PAI	Fonte
Algodão		2 d	Ferraz et al (1972)
	35 d	-	Blanco e Oliveira (1976)
	-	20 d	Cia et al (1978)
	-	20-30 d	Cia et al (1978)
	42 d	28 d	Laca-Buendia et al (1979)
	56 d	28 d	Laca-Buendia et al (1979)
Cana-de-açucar	90 d	60 d	Azzi (1970)
	30-60 d	30 d	Blanco et al (1979)
	-	30 d	Graciano & Ramalho (1982)
Feijão	20 d	-	Blanco et al (1969)
	30 d	-	Vieira et al (1970)
	35 d	21 d	Willian (1973)
Soja	45-50 d	30 d	Blanco et al (1978)
	-	30 d	Blanco et al (1978)
	30 d	20 d	Garcia et al (1981)
	40 d	20 d	Durigan et al (1983)
	50 d	20 d	Durigan et al (1983)
	20 d	50 d	Rossi (1985)
	26 d	35 d	Velini (1989)

PERÍODO DE CONVIVÊNCIA

- Kenezevic et al. (1999) – época do estabelecimento da cultura em relação às infestantes
- Vandevender et al. (1997) –
- Plantas daninhas que emergem mais tarde do que as plantas de soja exercem menor impacto no rendimento final da cultura
- Plantas daninhas que emergem mais cedo são melhores competidoras por recursos do ambiente

PRINCIPAIS PLANTAS DANINHAS EM SOJA

- *Commelina* spp.
- *Spermacoce latifolia*
- *Chamaesyse hirta*
- *Desmodium tortuosum*
- *Euphorbia heterophylla*
- *Ipomoea* spp.
- *Digitaria* spp.
- *Conyza* spp.
- *Sida* spp.
- *Amaranthus* spp.
- *Bidens* spp.
- *Tridax procumbens*
- *Solanum americanum*
- *Richardia brasiliensis*
- *Senna* spp.
- *Acanthospermum australe*
- *Alternanthera tenella*
- *Portulaca oleracea*
- *Nicandra physaloides*
- **Trapoeraba**
- **Erva-quente**
- **Erva-de-santa-luzia**
- **Desmodium**
- **Leiteiro**
- **Corda-de-viola**
- **Capim-colchão**
- **Buva**
- **Guanxuma**
- **Caruru**
- **Picão-preto**
- **Erva-de-touro**
- **Maria-pretinha**
- **Poaia branca**
- **Fedegoso**
- **Carrapicho-rasteiro**
- **Apaga-fogo**
- **Beldroega**
- **Joá-de-capote**

3. MANEJO DE PLANTAS DANINHAS EM SOJA

OBJETIVOS DO MANEJO DE PLANTAS DANINHAS

- Evitar perdas devido à competição
- Beneficiar as condições de colheita
- Evitar o ↑ da infestação

Como manejar...

4. MÉTODOS DE MANEJO

- MEDIDAS PREVENTIVAS – ANTES DA SEMEADURA
- MEDIDAS CORRETIVAS – APÓS A SEMEADURA
- MANEJO DE ENTRESSAFRA: vazio sanitário, visando principalmente o manejo da ferrugem (*Phakopsora pachyrisi*) e diminuir banco de sementes

4.1. PREVENTIVO

- Evitar a introdução ou disseminação
- Baixo custo
- Eficiente
- Diversas maneiras...

sementes de boa qualidade (pureza)

Trabalhador: botina e roupa

limpeza de máquinas e implementos

Pátios...

Canais de irrigação...

Terraços...

Estradas...

eliminar focos de infestação

A boa dessecação permite:

- ✓ **Semeadura/germinação/emergência melhores**
- ✓ **Vantagem competitiva da soja sobre as plantas daninhas**
- ✓ **Utilização racional de máquinas e mão-de-obra**

4.2.MÉTODO CULTURAL

- Objetivo → favorecer o rápido desenvolvimento da cultura
- Um bom manejo permite que a planta cultivada ganhe no aspecto competitivo, em relação às daninhas (VICTORIA FILHO, 2000).
- Manejo do solo, da água e da cultura
- Diversas maneiras...

Escolha do genótipo...

Espaçamento...

Densidade...

Vigor...

Milho Safrinha+Brachiária

Pastoreio

Ano 2

Ano 2

Soja Precoce

Ano 1

rotação de culturas
(diversificação de ambiente)

Algodão safrinha

Ano 4

Ano 3

Ano 3

Crotalarias pectabilis

Soja Precoce

Época de semeadura...

Preparo do solo...

**Cobertura
morta...**

- Para algumas espécies → **palhada tem eficiência comparável à dos herbicidas**
- 6 a 10 t de palha ha⁻¹ → **controle entre 50 e 85% para as espécies mais sensíveis**
- **Cobertura deve ser espessa e uniforme...**

Sistema de cultivo vs. tiririca

Plantio convencional

Plantio direto – 2 anos

4.3. MÉTODO MECÂNICO

Mecânico

- É um método muito eficiente, porém lento e de difícil execução;
- sendo uma prática que evita que uma nova planta daninha venha a ser um problema sério no futuro (CONSTANTIN, 2001);
- Pode ser manual ou motomecanizado.

MÉTODO MECÂNICO

Manual ou capina

eficiente mas com alto custo e baixo rendimento

MÉTODO MECÂNICO

- Com trator e com tração animal

4.4. MÉTODO BIOLÓGICO

- Em fase de estudos, principalmente no Brasil
- Preconiza a utilização de fungos (micoherbicidas) no controle de plantas daninhas (Ex.: *Helminthosporium euphorbiae* - específico para o controle do amendoim bravo)

4.5. MÉTODOS DE MANEJO QUÍMICO

- Utilização de herbicidas seletivos ou não à cultura e que podem ser aplicados em diferentes períodos do manejo.
- Apresenta vantagens comparativas em relação à preço, ação rápida e eficiente.

MÉTODOS DE MANEJO

Químico

- Método mais utilizado → através do uso de herbicidas (25% do total de vendas de produtos químicos na agricultura brasileira)

Avanço da soja transgênica amplia uso de glifosato

A disseminação do plantio da soja transgênica no país tem provocado uma forte elevação no uso de agrotóxicos nos últimos anos. De 2000 a 2005, o consumo dos 15 principais ingredientes ativos contidos em herbicidas utilizados na soja aumentou 60%, apontam dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).

O volume saltou de 59,5 mil para 95,2 mil toneladas - em 2004, o consumo havia chegado a 102,3 mil toneladas, mas a crise do segmento de grãos interrompeu a evolução. No mesmo período de cinco anos, a área plantada de soja avançou 59% no país.

Anúncios Google

[Produção Chuva na Lavoura](#)
Prevenção a Temporal e Enchentes Irrigação Agrícola de Baixo Custo
www.chuva21.com.br

[Nunes Gramas](#)
grama, jardim, gramas vendas (15) 3272-8564 Gramas, dicas para plantio

Impacto ambiental

Agências espaciais e Google buscam formas de proteger florestas

O consumo do produto avançou **79,6%** no período 2000-2005.

Estado a plantar transgênicos, o consumo de glifosato cresceu 85% - e a área semeada, 30,8%. "Há um aumento de consumo muito grande de glifosato, bem acima da expansão da área plantada e não equivalente com outros herbicidas", afirma o geneticista Rubens Nodari, gerente de Recursos Genéticos do Ministério do Meio Ambiente.

De fato, quando se isola o glifosato dos demais herbicidas, o consumo cresceu 21,4% no período, enquanto a área plantada aumentou 59,1% até 2005. São ingredientes como trifluralina, imazetapir, lactofem, clomazona e cletodin.

"Os transgênicos não reduziram o uso de herbicidas. No Rio Grande, houve um aumento de 9 mil para 20,3 mil toneladas entre 2000 e 2004. Ou seja, uma variação quatro vezes maior que a elevação na área plantada", afirma o agrônomo Luiz Carlos Balcewicz, especialista da Diretoria de Conservação de Biodiversidade do Ibama.

Segundo Balcewicz, como em 2005 a crise do setor agrícola distorceu os resultados, também houve uma redução no consumo. "O uso intensivo do mesmo ingrediente ativo causou

Eucalipto, Ipês, Gramas, Brindes Moringa, Guanandi Cedro Australiano
www.arbocenter.com.br

[Notícias do Agronegócio](#)
Eventos, Artigos, Cotação Mercado Futuro, tempo, consultoria
www.ruralmt.com.br

[Soy Live - Flocos de Soja](#)

Internet 100%

MANEJO QUÍMICO

Vantagens

- Rendimento na aplicação
- Não causa lesões nas plantas
- Pequenas quantidades por área
- Prático, eficiência elevada e uniforme
- Geralmente → **boa economicidade**
- Permite o manejo em períodos chuvosos e daninhas na linha
- Opções de $\neq$ s compostos
- Aplicação em $\neq$ s fases da cultura...

MANEJO QUÍMICO

Escolha do produto

- identificação de plantas daninhas
- intensidade de ocorrência

MANEJO QUÍMICO – ÉPOCA DE APLICAÇÃO

- PPI
- PRÉ-EMERGENTE
- PÓS EMERGENTE
 - PÓS PRECOCE
 - PÓS NORMAL
 - PÓS TARDIA

MANEJO QUÍMICO

Classificação dos herbicidas

- **PPI (Pré Plantio Incorporado)** - antes da semeadura e com incorporação (necessita solo bem preparado, incorporação superficial e cuidado com o período entre a aplicação e o plantio)

MANEJO QUÍMICO

Classificação dos herbicidas

- PPI (Pré Plantio Incorporado)
- Herbicidas seletivos
- Solo úmido
- Devem ser incorporados ao solo (até 10 cm):
 - 1) ↑ volatilidade
 - 2) ↑ fotodecomposição
 - 3) ↓ solubilidade

MANEJO QUÍMICO

Classificação dos herbicidas

- **PPI (Pré Plantio Incorporado)**
- Diclosulam
- Imazaquin
- Metribuzin
- Pendimethalin
- **Trifluralina**

MANEJO QUÍMICO

Classificação dos herbicidas

- **PRÉ - Pré Emergente** - após sementeira e antes da emergência de plantas daninhas e cultura (necessita solo úmido e sementeira e aplicação sempre próximos a última gradagem ou “dessecação”)

MANEJO QUÍMICO

Classificação dos herbicidas

- **PRÉ - Pré Emergente**
- Volatilização e fotodegradação
- Daninhas em estágio inicial
- Não afetam a germinação
- Devem apresentar bom efeito residual
- Teor de argila e MO
- Condições do solo:
 - Úmido...
 - Limpo...
 - Destorroado...

MANEJO QUÍMICO

Classificação dos herbicidas

- **PRÉ - Pré Emergente**

- Alachlor

Clomazone

- Cyanazine

Flumetsulan

- Flumioxazin

Imazaquin

- Metolachlor

Sulfentrazone

- Trifluralina

MANEJO QUÍMICO

Classificação dos herbicidas

- **PÓS - Pós Emergente** - após emergência de plantas daninhas e cultura (cuidado com o estágio de desenvolvimento das plantas daninhas e da cultura e extensas áreas a serem realizadas)

MANEJO QUÍMICO

Classificação dos herbicidas

- **PÓS - Pós Emergente**

• Bentazon	Chlorimuron-ethyl ⁵
• Clethodim	Fluazifop-p-butyl ⁵
• Fomesafen	Flumioxazin
• Haloxyfop-methyl	Lactofen
• Sethoxydim	Glifosato

MANEJO QUÍMICO

utilização adequada

- menores riscos de toxidez (homem e meio ambiente)
- evita inconvenientes do método → fitotoxicidade ou não controle

Fitotoxidez: Chlorimuron-ethyl

Fitotoxidez: lactofen

MANEJO QUÍMICO

Dose a ser aplicada

- Depende do estágio de desenvolvimento

MANEJO QUÍMICO

Dose a ser aplicada

- Depende do estágio de desenvolvimento
- Da infestação

MANEJO QUÍMICO

Dose a ser aplicada

- Depende do estágio de desenvolvimento
- ... Da infestação
- ... Da espécie

MANEJO QUÍMICO

Desvantagens

- Erros na dose (sub e super-dose)
- Possibilidade de contaminação ambiental
- Mão-de-obra qualificada
- Risco de intoxicação
- R\$
- **Biótipos RESISTENTES aos herbicidas**

APLICAÇÃO EM PÓS EMERGÊNCIA PRECOCE

- MELHOR EFICIÊNCIA DOS HERBICIDAS
- APLICAÇÃO NOS ESTÁDIOS INICIAIS DE DESENVOLVIMENTO

DICOTILIDÔNEAS COM ATÉ DUAS FOLHAS

GRAMÍNEAS NÃO PERFILHADAS

APLICAÇÃO EM PÓS EMERGÊNCIA NORMAL

- EFICIÊNCIA AINDA ELEVADA DOS HERBICIDAS

DICOTILIDÔNEAS COM 4 – 6 FOLHAS

GRAMÍNEAS COM ATÉ 3 PERFILHOS

APLICAÇÃO EM PÓS EMERGÊNCIA TARDIA

- EFICIÊNCIA DOS HERBICIDAS TENDE A SER MENOR
- PLANTAS DANINHAS EM ESTÁDIOS ACIMA:
DICOTILIDÔNEAS COM 4 – 6 FOLHAS
GRAMÍNEAS COM ATÉ 3 PERFILHOS
POSSIVELMENTE JÁ OCORREU DANO À CULTURA
USO DE ADJUVANTES NA CALDA

ESTRATÉGIAS DE MANEJO QUÍMICO SOJA CONVENCIONAL

ESTRATÉGIAS DE MANEJO QUÍMICO SOJA TRANSGÊNICA

MANEJO QUÍMICO

Resistência

- Consiste na capacidade natural e herdável de alguns biótipos, dentro de uma determinada população, de sobreviver e se reproduzir após a exposição à dose de um herbicida, que seria letal a uma população normal (suscetível) da mesma espécie (Christoffoleti e López-Ovejero, 2008);

4.6. MANEJO QUÍMICO

Resistência

- O surgimento da resistência aos herbicidas é identificado, geralmente, quando 30% das plantas mostram-se resistentes (controle inferior a 80%);
- Resistência de certas plantas daninhas:
- *Brachiaria plantaginea* e *Digitaria ciliaris*, resistentes aos herbicidas inibidores da ACCase;
- *Bidens pilosa*, *Bidens subalternans*, *Euphorbia heterophylla* e *Parthenium hysterophorus*, resistentes aos herbicidas inibidores da enzima ALS,
- *Conyza bonariensis*, *Conyza canadensis*, *Lolium multiflorum*, *Digitaria insularis* e *Euphorbia heterophylla*, resistentes ao **glyphosate**, cujo mecanismo de ação é a inibição da EPSPs.

434 casos - 237 espécies - 82 culturas - 65 países

Herbicide-Resistant Weeds by Site of Action

This table lists the number of species resistant to each site of action. Please note that **many species have evolved resistance to more than one site of action**, so the grand total represents unique cases of resistance, not the number of species.
(click on a column header to sort, hover mouse over links for more information or click on a links for details)

#	Herbicide Group	HRAC Group	Example Herbicide	Dicots	Monocots	Total
1	ALS inhibitors	B	Chlorsulfuron	88	56	144
2	Photosystem II inhibitors	C1	Atrazine	49	23	72
3	ACCase inhibitors	A	Sethoxydim	0	46	46
4	PSI Electron Diverter	D	Paraquat	22	9	31
5	Synthetic Auxins	O	2,4-D	23	8	31
6	EPSP synthase inhibitors	G	Glyphosate	15	13	28
7	PSII inhibitor (Ureas and amides)	C2	Chlorotoluron	8	16	24
8	Microtubule inhibitors	K1	Trifluralin	2	10	12
9	Lipid Inhibitors (thiocarbamates)	N	Triallate	0	8	8
10	PPO inhibitors	E	Oxyfluorfen	6	0	6
11	Carotenoid biosynthesis (unknown target)	F3	Amitrole	1	4	5
12	PSII inhibitors (Nitriles)	C3	Bromoxynil	3	1	4
13	Long chain fatty acid inhibitors	K3	Butachlor	0	4	4
14	Carotenoid biosynthesis inhibitors	F1	Diflufenican	2	1	3
15	Antimicrotubule mitotic disrupter	Z	Flamprop-methyl	0	3	3
16	HPPD inhibitors	F2	Isoxaflutole	2	0	2
17	Glutamine synthase inhibitors	H	Glufosinate-ammonium	0	2	2
18	Cellulose inhibitors	L	Dichlobenil	0	2	2
19	Mitosis inhibitors	K2	Propham	0	1	1
20	Unknown	Z	Endothall	0	1	1
21	Cell elongation inhibitors	Z	Difenzoquat	0	1	1
22	Nucleic acid inhibitors	Z	MSMA	1	0	1
				222	209	431

154 herbicidas

**Do total de 25
mecanismos**

22 com resistência

SOJA TRANSGÊNICA RESISTENTE AO GLYPHOSATE

SOJA RR - profundas mudanças no manejo.

O **manejo na pré-semeadura**, normalmente recomendada para soja convencional, deve ser mantida.

O **uso continuado** do glyphosate modificará a dinâmica do estabelecimento das plantas daninhas, **resultando na seleção de biótipos resistentes** a esse herbicida.

..... é importante **rotacionar soja convencional e transgênica (soja RR)** e/ou herbicidas de diferentes mecanismos de ação.

.....**glyphosate em soja RR é mais uma alternativa de controle**

Brasil-Resistência

André Shimohiro

-dificuldades de controle,

-aumento no uso de agrotóxicos,

-aumento no custo de produção

-perda de produtividade.

Brasil 2012/13

Dose e Resistência

Fonte: Grazziero (EMBRAPA SOJA)

Brasil 2012/13

BAHIA REABRE A HIDROVIA DO SÃO FRANCISCO COM UM CARREGAMENTO DE CAROÇO DE ALGODÃO

www.agrodbo.com.br

Junho/2014
Ano 1.1 - Nº 56
R\$ 10,00

Tecnologia, Produção & Mercado

Agro DBO

Agora, só arrancando à mão.

Em muitos casos, as aplicações de herbicidas não funcionam mais no controle de ervas daninhas. Segundo especialistas, é fundamental reavaliar as técnicas de manejo de resistência.

Fonte: Grazziero (EMBRAPA SOJA)

- Jornalistas da AgroDBO relatam...
- A luta inglória contra as plantas daninhas.... cada vez mais resistentes...
- que muitos agricultores relaxam no manejo...vizinho leva a pior...
- nos últimos três anos a rotina do agricultor A.N. e seus tres filhos (Dourados-MS): pegar a velha enxada para arrancar amargoso que floresce nas lavouras de milho e soja....
- enxada parece coisa do passado, mas cada vez mais necessário....

Depoimentos de agricultores e técnicos

- Usar só glifosato? “Isso não vai voltar mais. Quem dera não tivesse feito isso.
- A resistência esta mudando tudo: sai a simplicidade entra a dificuldade”.
- O agricultor só se preocupa com a resistência quando tem o problema.
- “Nossos custos aumentaram”.
- Não vai haver outra tecnologia como o glifosato.
- Quem não se preocupar vai sair da agricultura.

Buva

Amargoso

Azevem

(*Conyza bonariensis*, *C. sumatrensis* e *C. canadensis*)

Capim-amargoso (*Digitaria insularis*),

Azevém (*Lolium multiflorum*)

Fonte: Grazziero (EMBRAPA SOJA)

Produtividade (Infestação de milho RR)

Matocompetição de milho RR na cultura da soja RR

C.V.: 16,6%

Para minimizar riscos de seleção de plantas tolerantes e resistentes

- 1.Recomenda-se a rotação de culturas**
- 2.Levantamento das infestações antes e após a dessecação**
- 3.Comece sempre com o “campo limpo” (2,4-D e outros para controle de folhas largas de difícil controle)**
- 4.Dose correta do herbicida residual em mistura com o dessecante**
- 5.No controle seletivo nunca aplique após a pl. daninha atingir 20 cm**
- 6.Fique atento para a necessidade de aplicações adicionais de glyphosate na cultura – infestações tardias aumentam o banco de sementes no próximo ciclo**
- 7.Limpeza de equipamentos no transporte entre campos**
- 8.Necessidade de relatar falhas**

Resistência de Plantas Daninhas a Herbicidas

TABELA PERIÓDICA DOS HERBICIDAS

ACCase		Nome Comum				PROTOX	
Clodinafop Diclofop Fenoxaprop Fluazifop Haloxifop Propaquizafop Quicazafop Clefoxydim Clethodim Sethoxydim Tepaloxymim	CAROTENO	FOTOSSISTEMA (FS)				Acifluorfen Fomesafen Lactofen Oxyfluorfen Flumioxazin Flumiclorac Oxadiazon Sulfentrazone Carfentrazone	
	Clomazone Isoxaflutole Norflurazon Mesotrione	FS I	FS II				
		Diquat Paraquat	Ametryne Atrazine Cyanazine Prometrine Simazine Metribuzin Hexazinone	Diuron Linuron Propanil Tebuthiuron*	Bentazon Isxynil		
A	F	D	C1	C2	C3	E	
ALS	EPSPS	DIVISÃO CELULAR			AUXINA		
Chlorimuron Halosulfuron Metsulfuron Nicosulfuron Oxasulfuron Pyrazosulfuron Bispyribac Azinsulfuron Pyrithiobac Iodosulfuron Foramsulfuron	Imazapic Imazamox Imazapyr Imazaquin Imazethapyr Cloransulam Diclosulam Flumetsulam Flazasulfuron Etoxisulfuron	Glyphosate Sulfosate	Raiz	Parte Aérea	2,4-D Dicamba Fluroxypyr Picloram Triclopyr Quinclorac		
	B	GLUTAMINA Amônio-glufosinato	Oryzalin Pendimethalin Trifluralin Thiazopyr	Molinate Thiobencarb Acetochlor Alachlor Dimethenamid Metolachlor		K1	N

Fonte: Gazziero et al. Embrapa Soja

* Várias marcas comerciais ** Classificação dos grupos químicos por letra, adotado pelo HRAC-Internacional.

Produtos no mesmo retângulo tem alta probabilidade de apresentar comportamento semelhante, em casos de populações resistentes.

Figura 06. Tabela periódica dos herbicidas com nome comum, fonte : Gazziero, D.L.P.; Puríssimo, C.; Adegas, F. S.; Voll, E.; Brighenti, A.M. ; Prete, C.E.C. Tabela periódica dos herbicidas. Folder nº4, fevereiro de 2004. Embrapa.

MANEJO DE ENTRESSAFRA

Gly+2,4-D 1,5/3,0+0,8/1,5)

- Diclosulam (30)
- Imazaquim (1,0)
- Metribuzin (1,0)
- Metsulfuron (4-6)
- Flumioxazin (150-200)
- Clorimuron (80-100)
- Imazetapyr (1,0)

- Gly+2,4-D (idem)
- Gly+Clorimuron (1,5/3,0 + 70/100)
- Gly+Heat (1,5/3,0 +50)
- Gramocil (2,0/3,0)
- Finale (2,5/3,5)

- Gramocil (1,5/2,0)
- Finale (2,0/2,5)
- Gly+Heat (1,5/2,5+50)

Dessecação em pré-colheita da soja

- Utilizada em área de produção de grãos.
- Objetivo: controlar as plantas daninhas ou uniformizar as plantas com problemas de haste verde/retenção foliar.
- Aplicações realizadas antes da cultura atingir o estágio reprodutivo “R7”, provocam perdas no rendimento.

Dessecação em pré-colheita da soja

- Para evitar que ocorram resíduos no grão colhido, deve observar-se o intervalo mínimo de sete dias entre a aplicação do produto e a colheita.
- Produtos utilizados: paraquat ou diquat
- Predominância de gramíneas: utilizar o Gramoxone.
- Predominância de folhas largas, principalmente corda-de-viola (*Ipomoea grandifolia*), utilizar o Reglone.

Qual o melhor método?

“... combinação dos métodos de manejo!”

Manejo de plantas daninhas na soja RR (Roundup Ready)

- **Gene que codifica a enzima (EPSPS)**
- **5-enolpiruvato shiquimato-3-fosfato sintase.**
- ***Isolado da Agrobacterium tumefaciens* estirpe CP4.**
- **Metaboliza o Glyfosate**
- **200 milhões de litros de Glyfosate (2002)**
- **Restrito a uma só empresa**

Opções de manejo em Plantas Daninhas

Fazer o plantio
no limpo

= dessecação

= primeira aplicação RR (pós emergência)

= segunda aplicação RR (pós emergência)

Soja Liberty Link® (LL) (A5547-127)

- Resistência ao Glufosinato de amônio (Finale ®)
- Resiste a doses 3x acima da recomendada (2,5 l/há)
- Gene: PAT (phosphinotricina-acetil-transferase)
- Bactéria: (*Streptomyces viridochromogenes*)
- 1998 nos EUA e Japão em 2002
- 2010 no Brasil
- PAT: acetilação do Glufosinato de amônio a produtos não tóxicos.

Cultivance® (BPS-CV127-9)

- Parceria: Basf e Embrapa
- SoyVance®: Imidazolinona
- Gene extraído de planta: *arabidopsis thaliana*

Gene: *csr1-2*

Soja resistente ao 2,4-D

Sementes

Tweetar

0

Curtir

Compartilhar

17

CTNBio aprova soja Dow resistente ao herbicida 2,4D

10/04/15 - 11:19

Comentários: 5

Visitas: 3851

Em reunião realizada nesta última quinta-feira (09.04), a CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) aprovou uma variedade de soja geneticamente modificada para resistir ao herbicida 2,4D. A empresa beneficiada por essa liberação comercial foi a Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda.

Além desse evento, a oleaginosa transgênica também confere tolerância ao herbicida glufosinato de amônio (evento DAS-68416-4). A solicitação havia sido realizada pela Dow Agrosciences no dia 13 de janeiro de 2011.

A liberação concedida provoca polêmica no Brasil em vista do fato de que o Ministério Público Federal move ação visando proibir o herbicida 2,4-D no País. A Procuradoria já havia acionado a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para que emitisse reavaliação sobre esse agroquímico – o que ainda não ocorreu. O MPF tentou inclusive impedir legalmente a CTNBio de emitir novas liberações, o que foi vetado pela Justiça brasileira.

Agrolink

Autor: Leonardo Gottens

Controle integrado de plantas daninhas

- O programa de manejo integrado utiliza a combinação dos métodos de controle de plantas daninhas para obter controle eficiente das espécies.
- Os agricultores devem ser estimulados a utilizar diversos métodos, com o objetivo de diminuir custos e tornar seu empreendimento sustentável.

RECOMENDAÇÕES

- **Em áreas de alta infestação de plantas daninhas**
- **1. Comece com o campo “no limpo” sem planta daninha**
- **2. Semear soja em espaçamentos mais adensados**
- **3. Usar herbicidas residuais associados ao glyphosate**
- **4. Usar glyphosate na dose certa e no momento correto**

RECOMENDAÇÕES

- **Plantas daninhas de difícil controle**

- 1. Dose x estágio crescimento (tamanho adequado de aplicação)**

- 2. Aplicações sequenciais pode ser necessário para controle de novos fluxos, especialmente em soja com espaçamentos largos**

ATENÇÃO - As informações do registro de agrotóxicos e afins constantes no AGROFIT estão de acordo com as bulas aprovadas pelo MAPA. Na prescrição do Receituário Agrônômico é imprescindível que o profissional consulte o rótulo e a bula do produto registrado. Recomendamos aos órgãos fiscalizadores e usuários consultar sempre a CGA/MAPA sobre eventuais divergências técnicas detectadas.

Produtos Agrotóxicos e afins sem registro, ilegais, falsificados ou contrabando. Denuncie: 0800 940 7030

[Apresentação](#)

[ACESSO RESTRITO/INFORMA PRODUÇÃO](#)

Tabela 1. Alternativas para o controle químico de plantas daninhas na cultura da soja. Comissão de Plantas Daninhas da Região Central do Brasil, 2008.

Nome Comum	Nome Comercial	Concentração (g/l ou g/kg)	Comercial kg ou /ha ⁻¹	Aplicação	Classe toxicológica	Observações
Acifluorfen-sódio	Blazer Sol	170	1,0 a 1,5	Pós	I	Para pressão superior a 60 lb/pol ² utilizar bico cônico. Não aplicar com baixa umidade relativa do ar
	Tackle 170	170	1,0 a 1,5	Pós	I	
Alachlor	Laço	480	5,0 a 7,0	Pré	I	Pouco eficaz em condições de alta infestação de capim marmelada. Aplicar em solo úmido bem preparado. No sistema convencional, se não chover, incorporar superficialmente.
Bentazon	Basagran 600	600	1,2	Pós	II	Aplicar com plantas daninhas no estágio 2-6 folhas conforme a espécie. Para carrapicho rasteiro, utilizar 2,0 l/ha com óleo mineral emulsionável. Intervalo de segurança - 90 dias
Bentazon + Acifluorfen-sódio	Volt	400 + 170	1,2	Pós	I	Aplicar com a soja no estágio de 3ª folha trifoliolada e as plantas daninhas com 2 a 4 folhas, conforme a espécie. Pode-se utilizar aplicações terrestres, com volume de aplicação de até 100 l/ha de calda, utilizando-se bicos e tecnologia específicos
	Classic	250	0,06 a 0,08	Pós	III	

Diclosulam	Spider 840	840	0,024 a 0,042	Pré	II	Não plantar no outono (safrinha) sorgo não recomendado pelo fabricante; brassicas e girassol somente após 18 meses
Fenoxaprop-p-ethy + Clethodim	Podium EW	50 + 50	0,625 a 1,0	Pós	II	Cultura de soja com pouco sombreamento ou em condições climáticas menos favoráveis ao controle, utilizar a dosagem de 1,0 l/ha, visando o controle de Brachiaria plantaginea e Cenchrus echinatus quando esta estiver na fase de pleno perfilhamento.
Fluazifop-p-butyl	Fusilade 250 EW	250	0,5 a 0,7	Pós	III	Aplicar com as gramíneas no estágio de 2 a 4 perfilhos.
Fluazifop-p-butyl + Fomesafen	Fusiflex	125 + 125	1,6 a 2,0	Pós	I	Aplicar no estágio recomendado para o controle de folhas largas (2 a 4 folhas). Controla culturas voluntárias de aveia e milho. Intervalo de segurança - 95 dias. Para amendoim-bravo (2 a 4 folhas) pode ser utilizado sequencialmente 0,8 + 0,8 l/ha com inte
Fluazifop-p-butyl + Fomesafen	Robust	250 + 250	1	Pós	III	Aplicar no estágio recomendado para o controle de folhas largas (2 a 4 folhas). Controla milho voluntário. Intervalo segurança 60 dias.
Flumetsulan	Scorpion	120	0,875 a 1,167	Pré	IV	Pode ser utilizado também em sistema de plantio direto.

Tabela 2. Eficiência de alguns herbicidas* aplicados em PPI, Pré e Pós-emergência, para o controle de plantas daninhas da cultura da soja em solos de Cerrados. Comissão de Plantas Daninhas da Região do Central do Brasil Adaptado de Embrapa 2008.

	<i>Acanthospermum australe</i> /Carrapicho-rasteiro	<i>Acanthospermum hispidum</i> /Carrapicho-de-carneiro	<i>Ageratum conyzoides</i> /Mentrasto	<i>Alternanthera tenella</i> /Apaga-fogo	<i>Amaranthus deflexus</i> /Caruru	<i>Amaranthus hybridus</i> /Caruru	<i>Amaranthus viridis</i> /Caruru-de-mancha	<i>Bidens pilosa</i> /Picão-preto	<i>Brachiaria decumbens</i> /Braquiaria	<i>Brachiaria plantaginea</i> /Capim-marmelada	<i>Calopogonium mucronoides</i> /Calopogonio
Bentazon + Acifluorfen (Volt)	M	-	S	-	-	-	S	S	-	-	-
Carfentrazone	S	S	-	-	S	S	S	-	-	-	-
Chlorimuron-ethyl	S	S	S	S	-	-	S	S	T	T	M ⁸
Clethodim	T	T	T	T	-	-	T	T	-	S	-
Clomazone ³	M	T	-	-	-	-	-	S	-	S	-
Cloransulam-methyl	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-
Diclosulam	S	S	S	-	-	-	S	S	-	-	-
Dimethenamide	M	-	S	S	-	-	S	M	-	S	-
Fenoxaprop-p-ethyl	T	T	T	T	-	-	T	T	-	S	-
Fenoxaprop-p-ethyl + Clethodim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-
Fluazifopp-butyl	T	T	T	T	-	-	T	T	S	S	-
Flumetsulan	S	S	S	S	-	-	S	S	-	-	-

Considerações Finais

- É evidente a importância econômica do controle das plantas daninhas na cultura da soja na fase inicial, para evitar a competição pelos fatores de produção, evitando a queda na produtividade na fase final do ciclo da cultura;
- A soja consiste na cultura com maior número plantas resistentes devido ao fato de consumir 50% do total de herbicidas aplicados.